

AP療法							
対象疾患 子宮体癌 3週ごと 6コース 催吐リスク：高度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール			
	ドキソルビシン	DXR、ADM	60mg/m ²	day1			
	シスプラチン	CDDP	50mg/m ²	day1			
1コース 21日							
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day21
Rp 01	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	3時間 1 袋		↓			
Rp 02	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	3時間 1 袋		↓			
Rp 03	点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液50ml	15分 3 A 1 瓶 1 瓶		↓			
Rp 04	点滴注射 ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液100ml	30分 60mg/m ² 1 瓶		↓			
Rp 05	点滴注射 シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	1時間 50mg/m ² 1 袋		↓			
Rp 06	点滴注射 フロセミド注20mg 生理食塩液100ml	30分 0.5 A 1 瓶		↓			
Rp 07	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋		↓			
Rp 08	点滴注射 20%マンニトール注射液300ml	2時間 1 瓶		↓			
Rp 09	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋		↓			
Rp 10	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋		↓			
Rp 11	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	4時間 1 袋			↓		
Rp 12	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	4時間 1 袋			↓		
Rp 13	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	4時間 1 袋			↓		
Rp 14	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	4時間 1 袋			↓		