

AFL+FOLFIRI						
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース	
	アフリベルセプトベータ	AFL	4mg/kg	day1	14日	
	レボホリナート	LLV	200mg/m ²	day1		
	イリノテカン	CPT-11,IRI	150mg/m ²	day1		
	フルオウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1		
	フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)		
RpNO 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示		day1	day2	day3	day14
Rp01 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A		↓				
Rp02 中心静脈注射 60分 生理食塩液100ml 1 瓶 アフリベルセプトベータ点滴静注用 4mg/kg		↓				
Rp03 中心静脈注射 30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A 生理食塩液100ml 1 瓶 ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶		↓				
Rp04 中心静脈注射 2時間 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	Rp05と同時に開始	↓				
Rp05 中心静脈注射 2時間 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 イリノテカン点滴静注液 150mg/m ²	Rp04と同時に開始	↓				
Rp06 中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオウラシル注 400mg/m ² 生理食塩液100ml 1 瓶		↓				
Rp07 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A		↓				
Rp08 中心静脈注射 46時間 フルオウラシル注 2400mg/m ² 生理食塩液100ml 希釈規定量	携帯型ポンプにて	↓	46時間		↓	
Rp09 中心静脈注射 生食注シリンジ20ml 1 筒				↓		