

BV (5mg/kg) + ロンサーフ (1-5, 8-12)																			
対象疾患 大腸癌 4週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：軽度	薬剤名		略語		標準用量		スケジュール		1コース										
	ベバ [®] シズマブ [®]		B-mab、BV		5mg/kg		day1,15		28日										
	トリフルリジン ・チピラシル		TAS-102		70mg/m ²		5日間服用、 2日休薬、 5日間服用、 16日休薬												
RpNo	薬剤名/手技/コメント		1回投与量(補正単位)		速度指示		day1	day5	day6	day7	day8	day12	day13	day14	day15	day28
Rp 01	点滴注射		生理食塩液20ml 1 A				↓										↓		
Rp 02	点滴注射		初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml 1 瓶 ベバシズマブ点滴静注用 5mg/kg				↓										↓		
Rp 03	側管(静注)		生理食塩液20ml 1 A				↓										↓		
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩(ロンサーフ)配合錠							→		休薬 (2日間)		→		休薬 (2日間+14日間)						
体表面積 (m ²)			初回基準量 (トリフルリジン相当量)			1日2回 朝食後、夕食後 5日間連続経口投与後2日間休薬。 これを2回繰り返したのち14日間休薬 減量方法：10mg/日ずつ行い、最低投与量は30mg/日													
1.07未満			35mg/回 (70mg/日)																
1.07以上～1.23未満			40mg/回 (80mg/日)																
1.23以上～1.38未満			45mg/回 (90mg/日)																
1.38以上～1.53未満			50mg/回 (100mg/日)																
1.53以上～1.69未満			55mg/回 (110mg/日)																
1.69以上～1.84未満			60mg/回 (120mg/日)																
1.84以上～1.99未満			65mg/回 (130mg/日)																
1.99以上～2.15未満			70mg/回 (140mg/日)																
2.15以上			75mg/回 (150mg/日)																