

BV(7.5mg/kg)+SOX (S1:dl-14)					
対象疾患 大腸癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1 コース
	ベバシズマブ	B-mab, BV	7.5mg/kg	day1	21日
	オキサリプラチン	LOHP, OX	130mg/m <sup>2</sup>	day1	
	エスワン	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-14	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	.....	day14	.....	day21
Rp 01 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓				
Rp 02 点滴注射 初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml 1 瓶 ベバシズマブ点滴静注 7.5mg/kg	↓				
Rp 03 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A グラニセトロン3mgバッグ100ml 1 袋	↓				
Rp 04 点滴注射 2時間 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 オキサリプラチン点滴静注液 130mg/m <sup>2</sup>	↓				
Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠	→ (day1夕食後からday15朝食後まで)			休薬	
体表面積 (藤本式)	初回基準量 (テガフル相当量)				
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回				
1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回				
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回				
1日2回 朝食後、夕食後					