

BV(5mg/kg)+IRIS(SI:dl-14)					
対象疾患 大腸癌 4週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	ベバシズマブ	B-mab、BV	5mg/kg	day1,15	28日
	イリノテカン	CPT-11、IRI	100mg/m ²	day1,15	
	エスワン	S-1	80mg/m ²	day1-14	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day15	day28
Rp 01 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓		↓		
Rp 02 点滴注射 初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml 1 瓶 ベバシズマブ点滴静注用 5mg/kg	↓		↓		
Rp 03 点滴注射 30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A 生理食塩液100ml 1 瓶 ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶	↓		↓		
Rp 04 点滴注射 90分 イリノテカン点滴静注液 100mg/m ² 生理食塩液500ml 1 袋	↓		↓		
Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓		↓		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠			→		休薬
体表面積 (藤本式)			初回基準量 (テガフル相当量)		
1.25m ² 未満			40mg/回		
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満			50mg/回		
1.5m ² 以上			60mg/回		
			(day1夕食後からday15朝食後まで)		
			1日2回 朝食後、夕食後		