

BV(5mg/kg)+mFOLF0X6						
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース	
	ベバシズマブ	B-mab、BV	5mg/kg	day1	14日	
	レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	day1		
	オキサリプラチン	L-OHP、OX	85mg/m ²	day1		
	フルオウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1		
フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)			
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day3	day14	
Rp01 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓					
Rp02 中心静脈注射 初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml 1 瓶 ベバシズマブ点滴静注用 5mg/kg	↓					
Rp03 中心静脈注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A グラニセトロン3mgバッグ100ml 1 袋	↓					
Rp04 中心静脈注射 2時間 Rp05と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	↓					
Rp05 中心静脈注射 2時間 Rp04と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ²	↓					
Rp06 中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオウラシル注 400mg/m ² 生理食塩液100ml 1 瓶	↓					
Rp07 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓					
Rp08 中心静脈注射 46時間 携帯型ポンプにて フルオウラシル注 2400mg/m ² 生理食塩液 規定希釈量	↓	46時間		↓		
Rp09 中心静脈注射 埋込カテ(抗悪性腫瘍剤) 生食注シリンジ20mL 1 筒			↓			