

BV(5mg/kg)+SLV5FU2							
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：軽度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	ベバシズマブ	B-mab,BV	5mg/kg	day1	14日		
	レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	day1			
	フルオウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1			
フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)				
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示			day1	day2	day3	day14
Rp 01	点滴注射 生理食塩液20ml	1 A	↓				
Rp 02	中心静脈注射 初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml ベバシズマブ点滴静注用	1 瓶 5mg/kg	↓				
Rp 03	中心静脈注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml	2 A 1 瓶	↓				
Rp 04	中心静脈注射 2時間 ブドウ糖注射液5%250ml レボホリナート点滴静注	1 瓶 200mg/m ²	↓				
Rp 05	中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオウラシル注 生理食塩液100ml	400mg/m ² 1 瓶	↓				
Rp 06	側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A	↓				
Rp 07	中心静脈注射 46時間 フルオウラシル注 生理食塩液	2400mg/m ² 規定希釈量	↓ 46時間 ↓				
Rp 08	中心静脈注射 生食注シリンジ20mL	1 筒			↓		