

BV(7.5mg/kg)+Cape.

対象疾患 大腸癌
3週ごと
PD(増悪)まで
催吐リスク：中等度

薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
ベバシズマブ	B-mab、BV	7.5mg/kg	day1	21日
カペシタビン	Cape	2000mg/m ² /日	day1-14	

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示

	day1	day14	day21
Rp 01 点滴注射 生理食塩液20ml 1 A	↓				
Rp 02 点滴注射 初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml 1 瓶 ベバシズマブ点滴静注 7.5mg/kg	↓				
Rp 03 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓				

カペシタビン錠 (day1夕食後からday15朝食後まで) **休薬**

体表面積 (duBois式)	初回投与量	減量段階1	減量段階2	1日2回 朝食後、夕食後 14日間内服 7日間休薬
1.36m ² 未満	1,200mg/回	900mg/回	600mg/回	
1.36m ² 以上1.41m ² 未満	1,500mg/回			
1.41m ² 以上1.51m ² 未満		1,200mg/回		
1.51m ² 以上1.66m ² 未満			900mg/回	
1.66m ² 以上1.81m ² 未満	1,800mg/回			
1.81m ² 以上1.96m ² 未満		1,500mg/回		
1.96m ² 以上2.11m ² 未満	2,100mg/回		1,200mg/回	
2.11m ² 以上				