


BV(7.5mg/kg)+XELIRI							
対象疾患 大腸癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	ベバシズマブ	B-mab、BV	7.5mg/kg	day1	21日		
	イリノテカン	CPT-11、IRI	200mg/m ²	day1			
	カペシタビン	Cape	1600mg/m ²	day1-14			
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day14	day21
Rp 01 点滴注射 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 02 点滴注射 生理食塩液100ml ベバシズマブ点滴静注	初回90分、2回目以降30分可 1 瓶 7.5mg/kg		↓				
Rp 03 点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液100ml ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg	30分 3 A 1 瓶 1 瓶		↓				
Rp 04 点滴注射 ブドウ糖注射液5%250ml イリノテカン点滴静注液	90分 1 瓶 200mg/m ²		↓				
Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓				
カペシタビン錠			 (day1夕食後からday15朝食後まで)			休薬	
体表面積 (duBois式)		1回用量(1日量)		1日2回 朝食後、夕食後			
1.31m ² 未満		900mg/回 (1800mg/日)					
1.31m ² 以上1.68m ² 未満		1200mg/回 (2400mg/日)					
1.68m ² 以上2.06m ² 未満		1500mg/回 (3000mg/日)					
2.06m ² 以上		1800mg/回 (3600mg/日)					