

BV+FOLFOSIRI							
対象疾患 大腸癌 2週ごと 12コース 催吐リスク：高度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	ベバシズマブ	B-mab、BV	5mg/kg	day1	14日		
	イリテカン	CPT-11,IRI	150mg/m ² (165mg/m ²)	day1			
	レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	day1			
	オキサリプラチン	L-OHP,OX	85mg/m ²	day1			
フルオウラシル	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)				
RpNO 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示			day1	day2	day3	day14
Rp 01 点滴注射	生理食塩液20ml	1 A	↓				
Rp 02 点滴注射	初回90分、2回目以降30分可 生理食塩液100ml ベバシズマブ点滴静注	1 瓶 5mg/kg	↓				
Rp 03 中心静脈注射	30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液100ml ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤 パロノセトロン静注0.75mg	3 A 1 瓶 1 瓶 1瓶	↓				
Rp 04 中心静脈注射	1時間 ブドウ糖注射液5%250ml イリノテカン点滴静注液	1 瓶 150mg/m ²	↓				
Rp 05 中心静脈注射	2時間 ブドウ糖注射液5%250ml レボホリナート点滴静注	1 瓶 200mg/m ²	↓				
			Rp. 06と同時に開始				
Rp 06 中心静脈注射	2時間 ブドウ糖注射液5%250ml オキサリプラチン点滴静注液	1 瓶 85mg/m ²	↓				
			Rp. 05と同時に開始				
Rp 07 側管(静注)	生理食塩液20ml	1 A	↓				
Rp 08 中心静脈注射	46時間 フルオウラシル注 生理食塩液100ml	2400mg/m ² 規定希釈量	↓ 46時間 ↓ ↓ ↓				
Rp 09 中心静脈注射	ゆっくりと 生食注シリンジ20mL	1 筒			↓		

CPT-11:オリジナルは165mg/m²、日本での承認用量を考慮し150mg/m²として登録