

Cmab+エンコラフェニフ+ビニメチニフ 【隔週】					
対象疾患 大腸癌 2週ごと PDまで 催吐リスク：最小度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	セツキシマブ	C-mab	500mg/m <sup>2</sup>	day1	14日
	エンコラフェニフ		300mg (1日1回)	毎日	
	ビニメチニフ		45mg/回 (1日2回)	毎日	

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	……	day14
Rp 01	点滴注射	15分		↓		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	4 A		↓		
	d-クロルフェニラミン注5mg	1 A		↓		
	生理食塩液50ml	1 瓶		↓		
Rp 02	点滴注射	15分		↓		
	生理食塩液50ml	1 瓶		↓		
Rp 03	点滴注射	2時間		↓		
	セツキシマブ注射液	400mg/m <sup>2</sup>		↓		
	生理食塩液50ml	1 袋		↓		
Rp 04	点滴注射	1時間		↓		
	生理食塩液250ml	1 袋		↓		
	エンコラフェニフ	300mg (1日1回)		→		
	ビニメチニフ	45mg/回 (1日2回)		→		

【エンコラフェニフ・ビニメチニフの減量に関して】

	エンコラフェニフ	ビニメチニフ
減量レベル	300mg(1日1回)	45mg/回(1日2回)
1段階減量	225mg(1日1回)	30mg/回(1日2回)
2段階減量	150mg(1日1回)	15mg/回(1日2回)
3段階減量	投与中止	投与中止