

| Cmab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ (初回) | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------|------|
| 対象疾患 大腸癌 1週 1コース 催吐リスク：最小度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1コース |
| | セツキシマブ [®] | C-mab | 400mg/m ² | day1 | 7日 |
| | エンコラフェニブ | | 300mg (1日1回) | 毎日 | |
| | ビニメチニブ [®] | | 45mg/回 (1日2回) | 毎日 | |
| RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示 | | | day1 | …… | day7 |
| Rp 01 | 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg d-クロルフェニラミン注5mg 生理食塩液50ml | 4 A 1 A 1 瓶 | ↓ | | |
| Rp 02 | 点滴注射 15分 生理食塩液50ml | 1 瓶 | ↓ | | |
| Rp 03 | 点滴注射 2時間 セツキシマブ注射液 生理食塩液50ml | 400mg/m ² 1 袋 | ↓ | | |
| Rp 04 | 点滴注射 1時間 生理食塩液250ml | 1 袋 | ↓ | | |
| | エンコラフェニブ | 300mg (1日1回) | → | | |
| | ビニメチニブ | 45mg/回 (1日2回) | → | | |

| Cmab(2回目以降) | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------|------|
| 対象疾患 大腸癌 1週ごと PDまで 催吐リスク：最小度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1コース |
| | セツキシマブ [®] | C-mab | 250mg/m ² | day1 | 7日 |
| | エンコラフェニブ | | 300mg (1日1回) | 毎日 | |
| | ビニメチニブ [®] | | 45mg/回 (1日2回) | 毎日 | |
| RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示 | | | day1 | …… | day7 |
| Rp 01 | 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg d-クロルフェニラミン注5mg 生理食塩液50ml | 1 A 1 A 1 瓶 | ↓ | | |
| Rp 02 | 点滴注射 15分 生理食塩液50ml | 1 瓶 | ↓ | | |
| Rp 03 | 点滴注射 1時間 セツキシマブ注射液 生理食塩液250ml | 250mg/m ² 1 袋 | ↓ | | |
| Rp 04 | 点滴注射 30分 生理食塩液100ml | 1 瓶 | ↓ | | |
| | エンコラフェニブ | 300mg (1日1回) | → | | |
| | ビニメチニブ | 45mg/回 (1日2回) | → | | |

【エンコラフェニブ・ビニメチニブの減量に関して】

| | エンコラフェニブ [®] | ビニメチニブ [®] |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 減量レベル | 300mg(1日1回) | 45mg/回(1日2回) |
| 1段階減量 | 225mg(1日1回) | 30mg/回(1日2回) |
| 2段階減量 | 150mg(1日1回) | 15mg/回(1日2回) |
| 3段階減量 | 投与中止 | 投与中止 |