

FOLFIRI					
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	day1	14日
	イリノテカン	CPT-11,IRI	150mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1	
	フルオロウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day3	day14
Rp 01 中心静脈注射 30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A 生理食塩液100ml 1 瓶 ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶	↓				
Rp 02 中心静脈注射 2時間 Rp.03と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	↓				
Rp 03 中心静脈注射 2時間 Rp.02と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 イリノテカン点滴静注 150mg/m ²	↓				
Rp 04 中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオロウラシル注 400mg/m ² 生理食塩液100ml 1 瓶	↓				
Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓				
Rp 06 中心静脈注射 46時間 携帯型ポンプにて フルオロウラシル注 2400mg/m ² 生理食塩液 規定希釈量	↓		↓	↓	
Rp 07 中心静脈注射 生食注シリンジ 20mL 1 筒			↓		