

mFOLF0X6								
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース			
	レボホリナート	LLV	200mg/m ²	day1	14日			
	オキサリプラチン	L-OHP,OX	85mg/m ²	day1				
	フルオロウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1				
フルオロウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)					
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day14
Rp 01	中心静脈注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml 1袋			↓				
Rp 02	中心静脈注射 Rp.03と同時に開始 2時間かけてゆっくりと ブドウ糖注射液5%250ml 1瓶 レボホリナート点滴静注 200mg/m ²			↓				
Rp 03	中心静脈注射 Rp.02と同時に開始 2時間かけてゆっくりと ブドウ糖注射液5%250ml 1瓶 オキサリプラチン点滴静注液 85mg/m ²			↓				
Rp 04	中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオロウラシル注 400mg/m ² 生理食塩液100ml 1瓶			↓				
Rp 05	側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A			↓				
Rp 06	中心静脈注射 46時間 携帯型ポンプにて フルオロウラシル注 2400mg/m ² 生理食塩液100ml 希釈規定量			↓ 46時間 ↓ ↓ ↓				
Rp 07	中心静脈注射 生食注シリンジ20ml 1筒					↓		