

Pmab+FOLFIRI							
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
	パニツムマブ	P-mab	6mg/kg	day1	14日		
	レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	day1			
	イリノテカン	CPT-11,IRI	150mg/m ²	day1			
	フルオロウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1			
フルオロウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)				
RpNO 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day14
Rp 01 点滴注射 生理食塩液 20ml	1 A		↓				
Rp 02 中心静脈注射 生理食塩液100ml パニツムマブ点滴静注	1時間 1 瓶 6mg/kg		↓				
Rp 03 中心静脈注射 生理食塩液50ml	5分 1 瓶		↓				
Rp 04 中心静脈注射 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液100ml ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg	30分 2 A 1 瓶 1 瓶 1 瓶		↓				
Rp 05 中心静脈注射 Rp06と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml レボホリナート点滴静注	2時間 1 瓶 200mg/m ²		↓				
Rp 06 中心静脈注射 Rp05と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml イリノテカン点滴静注液	2時間 1 瓶 150mg/m ²		↓				
Rp 07 中心静脈注射 フルオロウラシル注 生理食塩液100ml	急速(全開で15分) 400mg/m ² 1 瓶		↓				
Rp 08 側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 09 中心静脈注射 46時間 フルオロウラシル注 生理食塩液	携帯型ポンプにて 2400mg/m ² 規定希釈量		↓	46時間 ←-----→		↓	
Rp 10 中心静脈注射 生食注シリンジ	ゆっくりと 1 筒				↓		