

Pmab+mFOLFOX6								
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース			
	パニツムマブ	P-mab	6mg/kg	day1	14日			
	レボホリナート	LV	200mg/m ²	day1				
	オキサリプラチン	L-OHP、OX	85mg/m ²	day1				
	フルオロウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1				
フルオロウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)					
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	・・・	day14
Rp 01	点滴注射 生理食塩液 20ml	1 A		↓				
Rp 02	中心静脈注射 生理食塩液100ml パニツムマブ点滴静注	1時間 1 瓶 6mg/kg		↓				
Rp 03	中心静脈注射 生理食塩液50ml	5分 1 瓶		↓				
Rp 04	中心静脈注射 デキサメタゾン注射液3.3mg グラニセトロン点滴静注液3mgパック100ml	15分 2 A 1 袋		↓				
Rp 05	中心静脈注射 Rp06と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml レボホリナート点滴静注	2時間 1 瓶 200mg/m ²		↓				
Rp 06	中心静脈注射 Rp05と同時に開始 ブドウ糖注射液5%250ml オキサリプラチン点滴静注液	2時間 1 瓶 85mg/m ²		↓				
Rp 07	中心静脈注射 フルオロウラシル注 生理食塩液100ml	急速(全開で15分) 400mg/m ² 1 瓶		↓				
Rp 08	側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 09	中心静脈注射 フルオロウラシル注 生理食塩液	46時間 携帯型ポンプにて 2400mg/m ² 規定希釈量		↓	46時間		↓	
Rp 10	中心静脈注射 生食注シリンジ(20mL/筒)	ゆっくりと 1 筒				↓		