

SLV5FU2							
対象疾患 大腸癌	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
2週ごと	レボホリナート	LLV	200mg/m ²	day1	14日		
PD(増悪)まで	フルオウラシル(急速)	5-FU	400mg/m ²	day1			
催吐リスク：軽度	フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)			
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day14
Rp 01 中心静脈注射	15分		↓				
デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		↓				
生理食塩液50ml	1 瓶						
Rp 02 中心静脈注射	2時間		↓				
ブドウ糖注射液5%250ml	1 瓶						
レボホリナート点滴静注	200mg/m ²						
Rp 03 中心静脈注射	急速(全開で15分)		↓				
フルオウラシル注	400mg/m ²						
生理食塩液100ml	1 瓶						
Rp 04 側管(静注)			↓				
生理食塩液20ml	1 A						
Rp 05 中心静脈注射	46時間	携帯型ポンプにて	↓	↓	↓		
フルオウラシル注	2400mg/m ²		46時間				
生理食塩液100ml	希釈規定量						
Rp 06 中心静脈注射					↓		
生食注シリンジ20ml	1 筒						