

| XELOX(CAPOX) | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 対象疾患 大腸癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | | | | |
| | オキサリプラチン | LOHP、OX | 130mg/m ² | day1 | | | | |
| | カペシタビン | Cape. | 2000mg/m ² | day1-14 | | | | |
| 1コース 21日 | | | | | | | | |
| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(補正単位) | 速度指示 | day1 | | day14 | | day21 |
| Rp 01 | 点滴注射 | 15分 | | ↓ | | | | |
| | デキサメタゾン注射液3.3 mg | 2 A | | | | | | |
| | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml | 1 袋 | | | | | | |
| Rp 02 | 点滴注射 | 2時間 | | ↓ | | | | |
| | ブドウ糖注射液5%250ml | 1 瓶 | | | | | | |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130mg/m ² | | | | | | |
| Rp 03 | 側管(静注) | | | ↓ | | | | |
| | 生理食塩液20ml | 1 A | | | | | | |
| カペシタビン錠 (C法) | | | | → (day1夕食後からday15朝食後まで) | | | 休薬 | |
| 体表面積 (duBois式) | 初回投与量 | 減量段階1 | 減量段階2 | 1日2回 朝食後、夕食後 14日間内服 7日間休薬 | | | | |
| 1.36m ² 未満 | 1,200mg/回 | 900mg/回 | 600mg/回 | | | | | |
| 1.36m ² 以上1.41m ² 未満 | 1,500mg/回 | 1,200mg/回 | 900mg/回 | | | | | |
| 1.41m ² 以上1.51m ² 未満 | | | | | | | | |
| 1.51m ² 以上1.66m ² 未満 | 1,800mg/回 | 1,500mg/回 | 1,200mg/回 | | | | | |
| 1.66m ² 以上1.81m ² 未満 | | | | | | | | |
| 1.81m ² 以上1.96m ² 未満 | 2,100mg/回 | 1,200mg/回 | 1,200mg/回 | | | | | |
| 1.96m ² 以上2.11m ² 未満 | | | | | | | | |
| 2.11m ² 以上 | | | | | | | | |