

Cabazitaxel(25mg/m²)+PSL療法

対象疾患 前立腺癌
 3週ごと
 PD(増悪)まで
 催吐リスク：軽度

薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
カバジタキセル	Cabazitaxel	25mg/m ²	day1	21日
プレドニゾン	PSL	10mg/日	連日	

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	……	day21
Rp 01	静脈内注射 ゆっくりと			↓		
	生理食塩液20ml	0.5 A				
	d-クロルフェニラミン注5mg	1 A				
Rp 02	点滴注射 15分			↓		
	ファモチジン注射液20mg	1 A				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A				
	生理食塩液50ml	1 瓶				
Rp 03	点滴注射 30分			↓		
	強カネオミノファーゲンシー静注20mL	1 A				
	生理食塩液100ml	0.8 瓶				
Rp 04	点滴注射 1時間			↓		
	カバジタキセル点滴静注	25mg/m ²				
	生理食塩液250ml	1 袋				
Rp 05	点滴注射 1時間			↓		
	ソルデム1輸液200ml	1 袋				
	プレドニゾン錠5mg 2錠/分2 朝夕食後or朝昼食後 (1日10mg)			→		