

EP		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース		
対象疾患 尿路上皮腫瘍		シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	day1	21日		
3週ごと		エトポシド	VP-16	100mg/m ²	Day1,2,3			
4コース								
催吐リスク：高度								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day21
Rp 01	点滴注射	2時間		↓				
	生理食塩液500ml	1 袋		↓				
Rp 02	点滴注射	15分		↓				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	3 A		↓				
	生理食塩液100ml	1 瓶						
	パロノセトロン静注0.75mg	1 瓶						
Rp 03	点滴注射	2時間		↓				
	エトポシド注	100mg/m ²		↓				
	生理食塩液500ml	1 袋						
Rp 04	点滴注射	2時間		↓				
	ラクテック注500ml	1 袋		↓				
Rp 05	側管(静注)			↓				
	ラシックス注20mg	0.5 A		↓				
Rp 06	点滴注射	2時間		↓				
	シスプラチン点滴静注	80mg/m ²		↓				
	生理食塩液250ml	1 袋						
Rp 07	点滴注射	2時間		↓				
	ソルデム3A輸液500ml	1 袋		↓				
Rp 08	側管(静注)	ソルデム3A開始時側管		↓				
	ラシックス注20mg	0.5 A		↓				
Rp 09	点滴注射	2時間		↓				
	ラクテック注500ml	1 袋		↓				
Rp 10	点滴注射	2時間		↓				
	ラクテック注500ml	1 袋		↓				
Rp 11	点滴注射	15分			↓	↓		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A			↓	↓		
	生理食塩液100ml	1 瓶						
Rp 12	点滴注射	2時間			↓	↓		
	エトポシド注	100mg/m ²			↓	↓		
	生理食塩液500ml	1 袋						
Rp 13	側管(静注)				↓	↓		
	生理食塩液20ml	1 A			↓	↓		