

GC(CDDP+GEM)(アロ)									
対象疾患 尿路上皮腫瘍 4週ごと 6コース 催吐リスク：高度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール		1コース			
	ゲムシタビン	GEM	800mg/m ² (1000mg/m ²)	day1,8,15		28日			
	シスプラチン	CDDP	70mg/m ²	day2					
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day8	day15	day28	
Rp01 点滴注射 30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 生 2 A 生理食塩液50ml 1 瓶	↓			↓		↓			
Rp02 点滴注射 30分で 生理食塩液100ml 1 瓶 ゲムシタビン点滴静注用 800mg/m ²	↓			↓		↓			
Rp03 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓			↓		↓			
Rp04 点滴注射 2時間 ソルデム1輸液500ml 1 袋		↓							
Rp05 点滴注射 2時間 ソルデム3A輸液500ml 1 袋		↓							
Rp06 側管(点滴) 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A 生理食塩液50ml 1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶		↓							
Rp07 点滴注射 2時間 シスプラチン点滴静注 70mg/m ² 生理食塩液250ml 1 袋		↓							
Rp08 点滴注射 1時間 20%マンニトール注射液300ml 1 瓶		↓							
Rp09 点滴注射 2時間 ソルデム3A輸液500ml 1 袋		↓							
Rp10 点滴注射 2時間 ソルデム1輸液500ml 1 袋		↓							

GC(CDDP+GEM)(グラ)									
対象疾患 尿路上皮腫瘍 4週ごと 6コース 催吐リスク：高度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール		1コース			
	ゲムシタビン	GEM	800mg/m ² (1000mg/m ²)	day1,8,15		28日			
	シスプラチン	CDDP	70mg/m ²	day2					
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day8	day15	day28	
Rp01 点滴注射 30分 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A 生理食塩液50ml 1 瓶	↓			↓		↓			
Rp02 点滴注射 30分で 生理食塩液100ml 1 瓶 ゲムシタビン点滴静注用 800mg/m ²	↓			↓		↓			
Rp03 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓			↓		↓			
Rp04 点滴注射 2時間 ソルデム1輸液500ml 1 袋		↓							
Rp05 点滴注射 2時間 ソルデム3A輸液500ml 1 袋		↓							
Rp06 側管(点滴) 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A グラニセトロン3mgバッグ100ml 1 袋		↓							
Rp07 点滴注射 2時間 シスプラチン点滴静注 70mg/m ² 生理食塩液250ml 1 袋		↓							
Rp08 点滴注射 1時間 20%マンニトール注射液300ml 1 瓶		↓							
Rp09 点滴注射 2時間 ソルデム3A輸液500ml 1 袋		↓							
Rp10 点滴注射 2時間 ソルデム1輸液500ml 1 袋		↓							