

BEP療法 (BLM筋注)										1コース					
疾患名 精巣癌			薬剤名	略語	標準用量	スケジュール									
3週ごと			ブレオマイシン	BML	30mg/Body	day1,8,15									
最大コース数 4コース			エトポシド	VP-16	100mg/m ²	day1-5	21日								
催吐リスク：高度			シスプラチン	CDDP	20mg/m ²	day1-5									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day15	day21
Rp 01	点滴注射 2時間	ソリューゲンF注500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 02	点滴注射 2時間	シスプラチン投与時本管止め メトクロプラミド注射液10mg 1 A ソリューゲンF注500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 03	点滴注射 2時間	ラストレット投与時は止める ヴィーン3G輸液500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 04	点滴注射 2時間	メトクロプラミド注射液10mg 1 A ヴィーン3G輸液500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 05	点滴注射 13時間	ソルデム1輸液500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 06	筋肉内注射 筋注1	右臀部に筋注 生理食塩液 2ml リドカイン注1% 2ml ブレオマイシン注射用 15mg/Body		↓							↓		↓		
Rp 07	筋肉内注射 筋注2 (1の12時間後)	左臀部に筋注 生理食塩液 2ml リドカイン注1% 2ml ブレオマイシン注射用 15mg/Body		↓							↓		↓		
Rp 08	側管(点滴) 30分	デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A グラニセトロン3mgバック100ml 1 袋		↓											
Rp 09	側管(点滴) 30分	デキサメタゾン注射液3.3mg 1 A グラニセトロン3mgバック100ml 1 袋			↓	↓	↓	↓							
Rp 10	側管(点滴) 90分	フィルタ-より下流で 20%マンニトール注射液300ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 11	側管(点滴) 90分	投与時本管は止める シスプラチン点滴静注 20mg/m ² 生理食塩液500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 12	側管(点滴) 90分	フィルタ-より下流で 20%マンニトール注射液300ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 13	側管(点滴) 90分	かけてゆっくりと投与時本管は止める エトポシド注 100mg/m ² 生理食塩液500ml 1 瓶		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 14	側管(点滴) 30分	かけてゆっくりと グラニセトロン3mgバック100ml 1 袋		↓	↓	↓	↓	↓							
Rp 15	側管(点滴) 30分	デキサメタゾン注射液3.3mg 1 A 生理食塩液100ml 1 瓶							↓						
Rp 16	点滴注射 6時間	ソルデム3A輸液500ml 1 袋							↓	↓	↓		↓		
Rp 17	点滴注射 6時間	ソルデム3A輸液500ml 1 袋							↓	↓	↓		↓		
Rp 18	点滴注射 6時間	ソルデム3A輸液500ml 1 袋							↓	↓					
Rp 19	点滴注射 6時間	ソルデム3A輸液500ml 1 袋							↓	↓					