

CDDP+S-1 (day1-21)(アロ)												
対象疾患 胃癌 5週ごと PD(増悪)まで(CDDPは7コース以降は投与しない) 催吐リスク：高度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1クール							
	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	day8	35日							
	エスリン	S-1	80mg/m ²	day1-21								
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	……	day8	day9	day10	……	day21	……	day35
Rp 01	点滴注射 8時間 ソルデム1輸液500ml	1 袋				↓	↓	↓				
Rp 02	点滴注射 8時間 ソルデム1輸液500ml	1 袋				↓	↓	↓				
Rp 03	点滴注射 8時間 ソルデム1輸液500ml	1 袋				↓						
Rp 04	側管(点滴) 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A 生理食塩液50ml 1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶					↓						
Rp 05	側管(点滴) 2時間 メトクロプラミド注射液10mg 1 A ラクテック注500ml 1 袋					↓	↓	↓				
Rp 06	側管(点滴) 2時間 シスプラチン点滴静注 60mg/m ² 生理食塩液250ml 1 袋					↓						
Rp 07	側管(点滴) 2時間 フロセミド注20mg 0.5 A ソルデム3A輸液500ml 1 袋					↓	↓	↓				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠				 (day1夕食後からday22朝食後まで)							休薬	
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフル相当量)		1日2回 朝食後、夕食後								
1.25m ² 未満		40mg/回										
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満		50mg/回										
1.5m ² 以上		60mg/回										