

Nivolumab+mFOLFOX6								
対象疾患 胃癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース			
	ニボルマブ	NIVO	240mg/Body	day1	14日			
	レボホリナート	L-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1				
	オキサリプラチン	LOHP,OX	85mg/m <sup>2</sup>	day1				
	フルオウラシル(急速)	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	day1				
フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1-3(46時間)					
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	.....	day14
Rp 01	点滴注射 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 02	点滴注射 30分 生理食塩液100ml ニボルマブ点滴静注	1 瓶 240mg/Body		↓				
Rp 03	点滴注射 15分 生理食塩液50ml	1 瓶		↓				
Rp 04	中心静脈注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	3 A 1 袋		↓				
Rp 05	中心静脈注射 Rp.02と同時に開始 2時間かけてゆっくりと ブドウ糖注射液5%250ml レボホリナート点滴静注	1 瓶 200mg/m <sup>2</sup>		↓				
Rp 06	中心静脈注射 Rp.02と同時に開始 2時間かけてゆっくりと ブドウ糖注射液5%250ml オキサリプラチン点滴静注液	1 瓶 85mg/m <sup>2</sup>		↓				
Rp 07	中心静脈注射 急速(全開で15分) フルオウラシル注 生理食塩液100ml	400mg/m <sup>2</sup> 1 瓶		↓				
Rp 08	側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 09	中心静脈注射 46時間 フルオウラシル注 生理食塩液100ml	携帯型ポンプにて 2400mg/m <sup>2</sup> 希釈規定量		↓	46時間		↓	
Rp 10	中心静脈注射 生食注シリンジ20ml	1 筒				↓		