

Nivolumab+SOX(SI: dl-14)					
対象疾患 胃癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	ニボルマブ	NIVO	360mg/Body	day1	21日
	オキサリプラチン	L-OHP,OX	100mg/m ²	day1	
	エスロン	S-1	80mg/m ²	day1-14	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day14	day21
Rp 01 点滴注射 生理食塩液20ml	1 A	↓			
Rp 02 点滴注射 30分 生理食塩液100ml ニボルマブ点滴静注	1 瓶 360mg/Body	↓			
Rp 03 点滴注射 15分 生理食塩液50ml	1 瓶	↓			
Rp 04 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	2 A 1 袋	↓			
Rp 05 点滴注射 2時間 ブドウ糖注射液 5%500ml デキサメタゾン注射液3.3mg オキサリプラチン点滴静注液	1 瓶 0.5 A 100mg/m ²	↓			
Rp 06 側管(静注) 生理食塩液 20ml	1 A	↓			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠			 <small>(day1夕食後からday15朝食後まで)</small>		休薬
体表面積 (藤本式)	初回基準量 (テガフル相当量)	1日2回 朝食後、夕食後			
1.25m ² 未満	40mg/回				
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回				
1.5m ² 以上	60mg/回				