

Nivolumab+XELOX(CAPOX)								
対象疾患 胃癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース			
	ニボルマブ	NIVO	360mg/Body	day1	21日			
	オキサリプラチン	LOHP、OX	130mg/m ²	day1				
	カペシタビン	Cape.	2000mg/m ²	day1-14				
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day14	day21
Rp 01	点滴注射 生理食塩液20ml	1 A		↓				
Rp 02	点滴注射 30分 生理食塩液100ml ニボルマブ点滴静注	1 瓶 360mg/Body		↓				
Rp 03	点滴注射 15分 生理食塩液50ml	1 瓶		↓				
Rp 04	点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3 mg グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	2 A 1 袋		↓				
Rp 05	点滴注射 2時間 ブドウ糖注射液5%500ml デキサメタゾン注射液3.3 mg オキサリプラチン点滴静注液	1 瓶 0.5 A 130mg/m ²		↓				
Rp 06	側管(静注) 生理食塩液20ml	1 A		↓				
カペシタビン錠 (C法)				 (day1夕食後からday15朝食後まで)		休薬		
体表面積 (duBois式)	初回投与量	減量段階1	減量段階2	1日2回 朝食後、夕食後 14日間内服 7日間休薬				
1.36m ² 未満	1,200mg/回	900mg/回	600mg/回					
1.36m ² 以上1.41m ² 未満	1,500mg/回	1,200mg/回	900mg/回					
1.41m ² 以上1.51m ² 未満								
1.51m ² 以上1.66m ² 未満	1,800mg/回	1,500mg/回	1,200mg/回					
1.66m ² 以上1.81m ² 未満								
1.81m ² 以上1.96m ² 未満	2,100mg/回	1,500mg/回	1,200mg/回					
1.96m ² 以上2.11m ² 未満								
2.11m ² 以上								