

RAM+IRI								
対象疾患 胃癌 4週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク:中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース			
	ラムシルマブ	RAM	8mg/kg	Day1,15	28日			
	イリノテカン	CPT-11.IRI	150mg/m ²	Day1,15				
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day15	day28
Rp 01	点滴注射	30分						
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		↓		↓		
	d-クロルフェニラミン注5mg	1 A						
	パロノセトロン静注0.75mg	1 瓶						
	ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤	1 瓶						
	生理食塩液100ml	1 瓶						
Rp 02	点滴注射	1時間	2回目以降30分に短縮可					
	ラムシルマブ点滴静注液	8mg/kg		↓		↓		
	生理食塩液250ml	1 袋						
Rp 03	点滴注射	2回目まで1時間で	3回目以降15分に短縮可					
	生理食塩液50ml	1 袋		↓		↓		
Rp 04	点滴注射	90分						
	イリノテカン点滴静注液	150mg/m ²		↓		↓		
	生理食塩液500ml	1 袋						
Rp 05	側管(静注)							
	生理食塩液20ml	1 A		↓		↓		