


T-mab+G-SOX(SI : dl-14)

対象疾患 胃癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	トラスツズマブ： 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、6mg/kgで投与。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量(8mg/kg)で投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。 初回投与の忍容性が良好場合、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能。	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
		トラスツズマブ	HER,T-mab	(初回)8mg/kg、 (2回目以降)6mg/kg	day1	21日
		オキサリプラチン	L-OHP,OX	100mg/m <sup>2</sup>	day1	
		エスワン	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-14	

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	.....	day14	.....	day21
Rp 01	点滴注射	15分		↓				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A						
	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	1 袋						
Rp 02	点滴注射	2時間		↓				
	ブドウ糖注射液 5%500ml	1 瓶						
	デキサメタゾン注射液3.3mg	0.5 A						
	オキサリプラチン点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>						
Rp 03	点滴注射	全開で		↓				
	生理食塩液 50ml	1 瓶						
Rp 04	点滴注射	90分、2回目以降30分まで短縮可		↓				
	トラスツズマブ注射用	(初回)8mg/kg、 (2回目以降)6mg/kg	1 瓶 規定量					
	注射用水		1 瓶					
	生理食塩液250ml		1 瓶					
Rp 03	側管(静注)			↓				
	生理食塩液20ml	1 A						
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠				 (day1夕食後からday15朝食後まで)				休薬
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフル相当量)		1日2回 朝食後、夕食後				
1.25m <sup>2</sup> 未満		40mg/回						
1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満		50mg/回						
1.5m <sup>2</sup> 以上		60mg/回						