

HER+SP療法											
対象疾患 胃癌 1コース 21日 6コース(S-1、T-mabは病勢進行まで) 催吐リスク：高度	トラスツズマブ： 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、 6mg/kgで投与。 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、 改めて初回投与量(8mg/kg)で投与し、次回以降は 6mg/kgを3週間間隔で投与。 初回投与の忍容性が良好場合、2回目以降の投与時 間は30分間まで短縮可能。	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース					
		トラスツズマブ	HER,T-mab	(初回)8mg/kg、 (2回目以降)6mg/kg	day1	21日					
		シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	day1						
		エスワン	S-1	80mg/m ²	day1-15						
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示			day1	day2	day3	……	day14	……	day21
Rp 01 点滴注射 トラスツズマブ注射用 生理食塩液250ml	90分、2回目以降30分まで短縮可 (初回)8mg/kg、(2回目以降)6mg/kg 1 袋				↓						
Rp 02 点滴注射 ラクテック注500ml	2時間 1 袋				↓						
Rp 03 点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml パロノセトロン静注0.75mg	15分 3 A 1 瓶 1 瓶				↓						
Rp 04 点滴注射 シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	2時間 60mg/m ² 1 袋				↓						
Rp 05 点滴注射 ソルデム1輸液500ml	2時間 1 袋				↓						
Rp 06 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1 袋				↓						
Rp 07 点滴注射 ラクテック注500ml	翌日まで 1 袋				↓						
Rp 08 側管(点滴) シスプラチン後 側注 20%マンニトール注射液300ml	2時間 1 瓶				↓						
Rp 09 点滴注射 ラクテック注500ml	1 袋					↓	↓				
Rp 10 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	1 袋					↓	↓				
Rp 11 点滴注射 ラクテック注500ml	1 袋					↓	↓				
Rp 12 点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	1 袋					↓	↓				
Rp 13 点滴注射 ラクテック注500ml	1 袋					↓	↓				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠					→					休薬	
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフル相当量)			1日2回 朝食後、夕食後						
1.25m ² 未満		40mg/回									
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満		50mg/回									
1.5m ² 以上		60mg/回									