

HER+XP療法												
対象疾患 胃癌 3週ごと 6コース(Cape., T-mabは病勢増悪まで) 催吐リスク：高度		トラスツズマブ：投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、6mg/kgで投与。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量(8mg/kg)で投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。 初回投与の忍容性が良好場合、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可能		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース				
				トラスツズマブ	HER,T-mab	(初回)8mg/kg、 (2回目以降)6mg/kg	day1	21日				
				シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	day1					
				カペシタビン	Cape	2000mg/m ²	day1-14					
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示						day1	day2	day3	……	day14	……	day21
Rp 01	点滴注射 トラスツズマブ注射用 生理食塩液250ml	90分、2回目以降30分まで短縮可 (初回)8mg/kg、(2回目以降)6mg/kg 1袋				↓						
Rp 02	点滴注射 ラクテック注500ml	2時間 1袋				↓						
Rp 03	点滴注射 デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液50ml パロノセトロン静注0.75mg	15分 3 A 1瓶 1瓶				↓						
Rp 04	点滴注射 シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	2時間 80mg/m ² 1袋				↓						
Rp 05	点滴注射 ソルデム1輸液500ml	2時間 1袋				↓						
Rp 06	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	2時間 1袋				↓						
Rp 07	点滴注射 ラクテック注500ml	翌日まで 1袋				↓						
Rp 08	側管(点滴) 20%マンニトール注射液300ml	2時間 1瓶				↓						
Rp 09	点滴注射 ラクテック注500ml	1袋					↓	↓				
Rp 10	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	1袋					↓	↓				
Rp 11	点滴注射 ラクテック注500ml	1袋					↓	↓				
Rp 12	点滴注射 ソルデム3A輸液500ml	1袋					↓	↓				
Rp 13	点滴注射 ラクテック注500ml	1袋					↓	↓				
カペシタビン錠 (C法)						 (day1夕食後からday15朝食後まで)					休薬	
体表面積 (duBois式)		初回投与量	減量段階1	減量段階2		1日2回 朝食後、夕食後 14日間内服 7日間休薬						
1.36m ² 未満		1,200mg/回	900mg/回	600mg/回								
1.36m ² 以上1.41m ² 未満		1,500mg/回	1,200mg/回	900mg/回								
1.41m ² 以上1.51m ² 未満												
1.51m ² 以上1.66m ² 未満		1,800mg/回	1,500mg/回	900mg/回								
1.66m ² 以上1.81m ² 未満												
1.81m ² 以上1.96m ² 未満		2,100mg/回	1,500mg/回	900mg/回								
1.96m ² 以上2.11m ² 未満												
2.11m ² 以上				1,200mg/回								