


XELOX(CAPOX)								
対象疾患 胃癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール				
	オキサリプラチン	LOHP、OX	130mg/m <sup>2</sup>	day1				
	カペシタビン	Cape.	2000mg/m <sup>2</sup>	day1-14				
				1コース 21日				
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	.....	day14	.....	day21
Rp 01	点滴注射	15分		↓				
	デキサメタゾン注射液3.3 mg	2 A						
	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ100ml	1 袋						
Rp 02	点滴注射	2時間		↓				
	ブドウ糖注射液5%500ml	1 瓶						
	デキサメタゾン注射液3.3 mg	0.5 A						
	オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m <sup>2</sup>						
Rp 03	側管(静注)			↓				
	生理食塩液20ml	1 A						
カペシタビン錠 (C法)				 (day1夕食後からday15朝食後まで)			休薬	
体表面積 (duBois式)	初回投与量	減量段階1	減量段階2	1日2回 朝食後、夕食後 14日間内服 7日間休薬				
1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200mg/回	900mg/回	600mg/回					
1.36m <sup>2</sup> 以上1.41m <sup>2</sup> 未満	1,500mg/回	1,200mg/回	900mg/回					
1.41m <sup>2</sup> 以上1.51m <sup>2</sup> 未満								
1.51m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1,800mg/回	1,500mg/回	1,200mg/回					
1.66m <sup>2</sup> 以上1.81m <sup>2</sup> 未満								
1.81m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	2,100mg/回	1,500mg/回	1,200mg/回					
1.96m <sup>2</sup> 以上2.11m <sup>2</sup> 未満								
2.11m <sup>2</sup> 以上								