

| GEM+PTX | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------------|--------|-------|
| 対象疾患 乳癌 3週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：軽度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | 1コース |
| | ゲムシタビン | GEM | 1250mg/m ² | day1,8 | 21日 |
| | パクリタキセル | PTX | 175mg/m ² | day1,8 | |
| RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示 | day1 | | day8 | | day21 |
| Rp 01 点滴注射 30分 ファモチジン注射液20mg 1 A デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A d-クロルフェニラミン注5mg 1 A 生理食塩液100ml 1 瓶 | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 02 点滴注射 3時間 ブドウ糖注射液5%500ml 1 瓶 パクリタキセル 175mg/m ² | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 03 点滴注射 5分 生理食塩液50ml 1 瓶 | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 04 点滴注射 30分で 生理食塩液100ml 1 瓶 ゲムシタビン点滴静注用 1250mg/m ² | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A | ↓ | | ↓ | | |