FP (アロ)

対象疾患 食道癌（遠隔転移を有する症例や、再発例。術前または術後の補助化学療法）
4週ごと(術前は3週ごと)
2コース
催吐リスク：高度

薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	800mg/㎡	day1-5	28日(21日)
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	80mg/㎡	day1	

RpNo 薬剤名/手技/コメント　1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day3	day4	day5	・・・・・	day28
Rp 01　点滴注射　3時間 生理食塩液500ml　1 瓶	↓						
Rp 02　点滴注射　3時間 生理食塩液500ml　1 瓶	↓						
Rp 03　点滴注射　30分 デキサメタゾン注射液3.3mg　3 A ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤　1 瓶 パロノセトロン静注0.75mg　1 瓶 生理食塩液100ml　1 瓶	↓						
Rp 04　点滴注射　2時間 シスプラチン点滴静注　80mg/㎡ 生理食塩液250ml　1 袋	↓						
Rp 05　点滴注射　24時間 フルオロウラシル注　800mg/㎡ ブドウ糖注射液5%500ml　1 瓶	↓	↓	↓	↓	↓		
Rp 06　側管(点滴)　1時間　シスプラチン投与後に 20%マンニトール注射液300ml　1 瓶	↓						
Rp 07　側管(点滴)　2時間　マンニットール投与後 生理食塩液500ml　1 瓶	↓						
Rp 08　側管(点滴)　2時間 生理食塩液500ml　1 瓶		↓	↓				
Rp 09　側管(点滴)　2時間 フロセミド注20mg　0.5 A ソルデム3A輸液500ml　1 袋		↓	↓				
Rp 10　点滴注射 day2に取り付けクランプし、day5終了時に全量フラッシュ 生理食塩液50ml　1 瓶		↓					