PTX単独

対象疾患 食道癌（切除不能進行・再発。２次治療以降）
７週ごと
PD(増悪)まで
催吐リスク：軽度

| 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | １コース |
|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ | PTX | 100mg/㎡ | day1,8,15,22,29,36 | ４９日 |

| RPNO 薬剤名/手技/コメント　1回投与量(補正単位) 速度指示 | day1 | ・・・・・ | day8 | ・・・・・ | day15 | ・・・・・ | day22 | ・・・・・ | day29 | ・・・・・ | day36 | ・・・・・ | day49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 01　点滴注射　30分<br>ファモチジン注射液20mg　1 A<br>デキサメタゾン注射液3.3mg　2 A<br>d-クロルフェニラミン注5mg　1 A<br>生理食塩液100ml　1 瓶 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 02　点滴注射　1時間<br>ブドウ糖注射液5%250ml　1 瓶<br>パクリタキセル注　100mg/㎡ | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| Rp 03　側管(静注)<br>生理食塩液20ml　1 A | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |