

RT(50.4G)-FP(アロ)														
対象疾患 食道癌 (Stage II ~ III)			薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1クール							
1コース42日			フルオウラシル	5-FU	1000mg/m ²	d14,d29-32	42日							
最大コース数1コース			シスプラチン	CDDP	75mg/m ²	day1,day29								
催吐リスク：高度														
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day2	day3	day4	day29	day30	day31	day32	day42
Rp 01	点滴注射 生理食塩液500ml	3時間 1 袋		↓					↓					
Rp 02	点滴注射 生理食塩液500ml	3時間 1 袋		↓					↓					
Rp 03	点滴注射 ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤 1 瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 3 A パロノセトロン静注0.75mg 1 瓶 生理食塩液100ml 1 瓶	30分		↓					↓					
Rp 04	点滴注射 シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	2時間 75mg/m ² 1 袋		↓					↓					
Rp 05	点滴注射 フルオロウラシル注 ブドウ糖注射液5%500ml	24時間 1000mg/m ² 1 瓶		↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓		
Rp 06	点滴注射 20%マンニトール注射液300ml	1時間 1 瓶		↓					↓					
Rp 07	点滴注射 生理食塩液500ml	2時間 1 袋		↓					↓					
Rp 08	側管(点滴) ソルデム1輸液500ml	2時間 1 袋			↓	↓				↓	↓			
Rp 09	側管(点滴) フロセミド注20mg ソルデム3A輸液500ml	2時間 0.5 A 1 袋			↓	↓				↓	↓			
Rp 10	点滴注射 day2に取り付けクランプし、day4終了時に全量フラッシュ 生理食塩液50ml	1 袋			↓					↓				