

## RT(60G)-FP (アロ)

対象疾患 食道癌 (Stage I、Stage III (T4)~IVA)

1コース42日

最大コース数1コース

催吐リスク：高度

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示

			day1	day2	day3	day4	.....	day29	day30	day31	day32	.....	day42
Rp 01	点滴注射 生理食塩液500ml	3時間 1 袋	↓					↓					
Rp 02	点滴注射 生理食塩液500ml	3時間 1 袋	↓					↓					
Rp 03	点滴注射 ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤 デキサメタゾン注射液3.3mg パロノセトロン静注0.75mg 生理食塩液100ml	30分 1 瓶 3 A 1 瓶 1 瓶	↓					↓					
Rp 04	点滴注射 シスプラチン点滴静注 生理食塩液250mL	2時間 70mg/m <sup>2</sup> 1 袋	↓					↓					
Rp 05	点滴注射 フルオロウラシル注 ブドウ糖注射液5%500ml	24時間 700mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓		
Rp 06	点滴注射 20%マンニトール注射液300ml	1時間 1 瓶	↓					↓					
Rp 07	点滴注射 生理食塩液500ml	2時間 1 袋	↓					↓					
Rp 08	側管(点滴) ソルデム1輸液500ml	2時間 1 袋		↓	↓				↓	↓			
Rp 09	側管(点滴) フロセミド注20mg ソルデム3A輸液500ml	2時間 0.5 A 1 袋		↓	↓				↓	↓			
Rp 10	点滴注射 day2に取り付けクランプし、day4終了時に全量フラッシュ 生理食塩液50ml	1 袋		↓					↓				

薬剤名

略語

標準用量

スケジュール

1クール

フルオロウラシル

5-FU

700mg/m<sup>2</sup>

d1-4,d29-32

42日

シスプラチン

CDDP

70mg/m<sup>2</sup>

day1,day29