

GEM単独										
対象疾患 膵癌		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース				
4週ごと		ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15	28日				
PD(増悪)まで										
催吐リスク：軽度										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day8	day15	day28
Rp 01	点滴注射	15分		↓		↓		↓		
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		↓		↓		↓		
	生理食塩液50ml	1 瓶		↓		↓		↓		
Rp 02	点滴注射	30分で		↓		↓		↓		
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		↓		↓		
	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²		↓		↓		↓		
Rp 03	側管(静注)			↓		↓		↓		
	生理食塩液20ml	1 A		↓		↓		↓		

GEM単独										
対象疾患 膵癌		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース				
4週ごと		ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15	28日				
PD(増悪)まで										
催吐リスク：軽度										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day8	day15	day28
Rp 01	点滴注射	15分		↓		↓		↓		
	生理食塩液50ml	1 瓶		↓		↓		↓		
Rp 02	点滴注射	30分で		↓		↓		↓		
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		↓		↓		
	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²		↓		↓		↓		
Rp 03	側管(静注)			↓		↓		↓		
	生理食塩液20ml	1 A		↓		↓		↓		