

nal-IRI+LV5FU2					
対象疾患 大腸癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	リボゾーマル イリノテカン	nal-IRI	70mg/m ²	day1	14日
	レボホリナート	L-LV	200mg/m ²	day1	
	フルオウラシル(持続)	5-FU	2400mg/m ²	day1-3(46時間)	
RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示	day1	day2	day3	
Rp 01 中心静脈注射 15分 生理食塩液50ml 1 A パロノセトロン静注 1 瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 2 A	↓				
Rp 02 中心静脈注射 90分 生理食塩液500ml 1 瓶 リボゾーマルイリノテカン点滴静注 70mg/m ²	↓				
Rp 03 中心静脈注射 全開 生理食塩液50ml 1 瓶	↓				
Rp 04 中心静脈注射 2時間 ブドウ糖注射液5%250ml 1 瓶 レボホリナート点滴静注 200mg/m ²	↓				
Rp 05 側管(静注) 生理食塩液20ml 1 A	↓				
Rp 06 中心静脈注射 46時間 携帯型ポンプにて フルオウラシル注 2400mg/m ² 生理食塩液 規定希釈量	↓	46時間	↓		
Rp 07 中心静脈注射 生食注シリンジ20mL 1 筒			↓		