

GEM+CDDP+S-1(day1-7)					
対象疾患 胆管癌 2週ごと PD(増悪)まで 催吐リスク：中等度	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース
	シスプラチン	CDDP	25mg/m ²	day1	14日
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	day1	

RpNO 薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	day7	day14	
Rp 01 点滴注射 生理食塩液1L	4時間 1 袋		↓					
Rp 02 側管(点滴) 20%マンニトール注射液300ml	45分 1 瓶		↓					
Rp 03 側管(点滴) デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液100ml パロノセトロン静注0.75mg	30分 2 A 1 瓶 1 瓶		↓					
Rp 04 側管(点滴) シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	1 時間 25mg/m ² 1 袋		↓					
Rp 05 点滴注射 生理食塩液100ml ゲムシタビン点滴静注用	30分で 1 瓶 1000mg/m ²		↓					
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠			 (day1夕食後からday8朝食後まで)				休薬	
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフル相当量)		1日2回 朝食後、夕食後				
1.25m ² 未満		40mg/回						
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満		50mg/回						
1.5m ² 以上		60mg/回						