


GEM+S-1(day1-14)		薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース				
対象疾患 胆管癌		ゲムシタピン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日				
4週ごと										
PD(増悪)まで										
催吐リスク：軽度										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(補正単位)	速度指示	day1	.....	day8	.....	day14	.....	day21
Rp 01	点滴注射 15分			↓		↓				
	デキサメタゾン注射液3.3mg	2 A		↓		↓				
	生理食塩液50ml	1 瓶								
Rp 02	点滴注射 30分で			↓		↓				
	生理食塩液100ml	1 瓶		↓		↓				
	ゲムシタピン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>								
Rp 03	側管(静注)			↓		↓				
	生理食塩液20ml	1 A		↓		↓				
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)配合OD錠								<b>休薬</b> (day1夕食後からday15朝食後まで)		
体表面積 (藤本式)		初回基準量 (テガフル相当量)		1日2回 朝食後、夕食後						
1.25m <sup>2</sup> 未満		40mg/回								
1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満		50mg/回								
1.5m <sup>2</sup> 以上		60mg/回								