

Pembrolizumab+FP										
対象疾患	薬剤名	略語	標準用量	スケジュール	1コース					
頭頸部癌	ペンブロリズマブ		200mg/body	day1	21日					
3週ごと	シスプラチン	CDDP	100mg/m ²	day1						
6コース	フルオロウラシル	5-FU	1000mg/m ² /日	day1-4						
催吐リスク：高度	RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示				day1	day2	day3	day4	……	day21
Rp 01	点滴注射	3時間	生理食塩液500ml	1 袋	↓					
Rp 02	点滴注射	3時間	生理食塩液500ml	1 袋	↓					
Rp 03	点滴注射	30分	生理食塩液100ml ペンブロリズマブ点滴静注	1 瓶 200mg/body	↓					
Rp 04	点滴	15分	生理食塩液50ml	1 瓶	↓					
Rp 05	点滴注射	30分	デキサメタゾン注射液3.3mg 生理食塩液100ml ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射剤 パロノセトロン静注0.75mg	3 A 1 瓶 1 瓶 1 瓶	↓					
Rp 06	点滴注射	2時間	シスプラチン点滴静注 生理食塩液250ml	100mg/m ² 1 袋	↓					
Rp 07	点滴注射	24時間	フルオロウラシル注 ブドウ糖注射液5%500ml	1000mg/m ² 1 瓶	↓	↓	↓	↓		
Rp 08	側管(点滴)	1時間	20%マンニトール注射液300ml	1 瓶	↓					シスプラチン投与後に
Rp 09	側管(点滴)	2時間	生理食塩液500ml	1 袋	↓					マンニトール投与後に
Rp 10	側管(点滴)	2時間	ソルデム1輸液500ml	1 袋		↓	↓			
Rp 11	側管(点滴)	2時間	フロセミド注20mg ソルデム3A輸液500ml	0.5 A 1 袋		↓	↓			
Rp 12	点滴注射	day2に取り付けクランプし,day4終了時に全量フラッシュ 大塚生食注50ml		1 瓶		↓				