

| PTX+Cmab (初回) | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 対象疾患 頭頸部癌 1週 1コース 催吐リスク：最小度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | |
| | セツキシマブ [®] | C-mab | 400mg/m ² | day1 | 1コース 7日 |
| | パ [®] クリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1 | |
| RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示 | day1 | | day7 | | |
| Rp 01 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 4 A ファモチジン注射液20mg 1 A d-クロルフェニラミン注5mg 1 A 生理食塩液50ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 02 点滴注射 30分 生理食塩液100ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 03 点滴注射 2時間 セツキシマブ注射液 400mg/m ² 生理食塩液50ml 1 袋 | ↓ | | | | |
| Rp 04 点滴注射 1時間 生理食塩液100ml 1 袋 | ↓ | | | | |
| Rp 05 点滴注射 1時間 パクリタキセル注 80mg/m ² ソルデム1輸液200ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 06 側管(静注) 生理食塩液20ml | ↓ | | | | |

| PTX+Cmab (2回目以降) | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------------------|--------|------------|
| 対象疾患 頭頸部癌 1週 PDまで 催吐リスク：最小度 | 薬剤名 | 略語 | 標準用量 | スケジュール | |
| | セツキシマブ [®] | C-mab | 250mg/m ² | day1 | 1コース 7日 |
| | パ [®] クリタキセル | PTX | 80mg/m ² | day1 | |
| RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量(補正単位) 速度指示 | day1 | | day7 | | |
| Rp 01 点滴注射 15分 デキサメタゾン注射液3.3mg 4 A ファモチジン注射液20mg 1 A d-クロルフェニラミン注5mg 1 A 生理食塩液50ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 02 点滴注射 30分 生理食塩液100ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 03 点滴注射 1時間 セツキシマブ注射液 250mg/m ² 生理食塩液50ml 1 袋 | ↓ | | | | |
| Rp 04 点滴注射 1時間 生理食塩液100ml 1 袋 | ↓ | | | | |
| Rp 05 点滴注射 1時間 パクリタキセル注 80mg/m ² ソルデム1輸液200ml 1 瓶 | ↓ | | | | |
| Rp 06 側管(静注) 生理食塩液20ml | ↓ | | | | |